

## ORDONNANCE

### (Exemple à voir ci-dessous)

***Candidose unguéale Infection de l'ongle et de la région péri-unguéale par une levure du genre Candida (C albicans)***

#### **MYCOSTER® 8 % solution filmogène :**

Une application par jour sur le ou les ongles atteints pendant 3 mois.

#### **MYCOSTER® crème :**

Deux applications quotidiennes sur la zone infectée autour de l'ongle pendant 6 semaines.

#### **Alternatives thérapeutiques (Si ongle hyperkératosique)**

#### **AMYCOR ONYCHOSET®® (bifonazole): avulsion chimique de l'ongle pathologique.**

Appliquer 1 fois par jour sur chaque ongle atteint et maintenir sous un pansement occlusif, renouveler l'application tous les jours (baigner l'ongle dans de l'eau chaude et éliminer la partie ramollie avec le grattoir à chaque renouvellement) jusqu'à élimination complète de l'ongle pathologique (1 à 3 semaines)

#### **Puis, après lyse de l'ongle :**

#### **AMYCOR® (bifonazole) crème :**

1 application par jour pendant 4 à 8 semaines

#### **SPRAY ANTIFONGIQUE :**

Une pulvérisation quotidienne dans les chaussures.

#### **Si échec du traitement local ou si plusieurs ongles atteints :**

#### **LAMISIL® (terbinafine) 250 mg :**

Un comprimé par jour pendant 3 à 6 mois (ongle de la main) et 6 à 12 mois (ongle du pied).

**Docteur [Praticien - Prénom] [Praticien - Nom]**

----

CLMO Lyon Ouest  
Centre Laser Médical Lyon Ouest  
Espace Victor Hugo  
13 Avenue Victor Hugo  
69160 Tassin la demi-lune

----

**Sur rendez-vous**  
**TEL. : 04 78 64 69 95**

**N° ADELI : [Praticien - ADELI / AM]**  
**N° RPPS : [Praticien - RPPS]**

**MYCOSTER® 8 % solution filmogène :**

Une application par jour sur le ou les ongles atteints pendant 3 mois.

**SPRAY ANTIFONGIQUE :**

Une pulvérisation quotidienne dans les chaussures.

**Docteur [Praticien - Prénom] [Praticien - Nom]**

-----

CLMO Lyon Ouest  
Centre Laser Médical Lyon Ouest  
Espace Victor Hugo  
13 Avenue Victor Hugo  
69160 Tassin la demi-lune

----

**Sur rendez-vous**  
**TEL. : 04 78 64 69 95**

**N° ADELI : [Praticien - ADELI / AM]**

**N° RPPS : [Praticien - RPPS]**

**MYCOSTER® crème :**

Deux applications quotidiennes sur la zone infectée autour de l'ongle pendant 6 semaines.

**SPRAY ANTIFONGIQUE :**

Une pulvérisation quotidienne dans les chaussures.

**Docteur [Praticien - Prénom] [Praticien - Nom]**

-----

CLMO Lyon Ouest  
Centre Laser Médical Lyon Ouest  
Espace Victor Hugo  
13 Avenue Victor Hugo  
69160 Tassin la demi-lune

----

**Sur rendez-vous**  
**TEL. : 04 78 64 69 95**

**N° ADELI : [Praticien - ADELI / AM]**

**N° RPPS : [Praticien - RPPS]**

**AMYCOR ONYCHOSET® (bifonazole): avulsion chimique de l'ongle pathologique.**

Appliquer 1 fois par jour sur chaque ongle atteint et maintenir sous un pansement occlusif, renouveler l'application tous les jours (baigner l'ongle dans de l'eau chaude et éliminer la partie ramollie avec le grattoir à chaque renouvellement) jusqu'à élimination complète de l'ongle pathologique (1 à 3 semaines)

**SPRAY ANTIFONGIQUE :**

Une pulvérisation quotidienne dans les chaussures.

**Docteur [Praticien - Prénom] [Praticien - Nom]**

-----

CLMO Lyon Ouest  
Centre Laser Médical Lyon Ouest  
Espace Victor Hugo  
13 Avenue Victor Hugo  
69160 Tassin la demi-lune

-----

**Sur rendez-vous**  
**TEL. : 04 78 64 69 95**

**N° ADELI : [Praticien - ADELI / AM]**

**N° RPPS : [Praticien - RPPS]**

**AMYCOR® (bifonazole) crème :**

1 application par jour pendant 4 à 8 semaines

**SPRAY ANTIFONGIQUE :**

Une pulvérisation quotidienne dans les chaussures.

**Docteur [Praticien - Prénom] [Praticien - Nom]**

-----

CLMO Lyon Ouest  
Centre Laser Médical Lyon Ouest  
Espace Victor Hugo  
13 Avenue Victor Hugo  
69160 Tassin la demi-lune

-----

**Sur rendez-vous**  
**TEL. : 04 78 64 69 95**

**N° ADELI : [Praticien - ADELI / AM]**

**N° RPPS : [Praticien - RPPS]**

**LAMISIL® (terbinafine) 250 mg :**

Un comprimé par jour pendant 3 à 6 mois (ongle de la main) et 6 à 12 mois (ongle du pied).

**SPRAY ANTIFONGIQUE :**

Une pulvérisation quotidienne dans les chaussures.