

Patients	Secrétariat	Médecins	Salle d'attente	Salles de soins
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Report du rdv si : fièvre, toux, courbature, diarrhée ou anosmie-agueusie sous 6 semaines à partir des premiers symptômes</b></li> <li>• Si en avance, attente à l'extérieur</li> <li>• Venue avec un masque</li> <li>• Accompagnant reste dehors (sauf enfant ou cas de force majeure)</li> <li>• Utilisation d'une solution hydro-alcoolique à l'entrée</li> <li>• Préférence CB et si chèque avec son propre stylo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accueil à au moins 1m</li> <li>• Mise en place de panneau Plexiglas</li> <li>• Masque ou visière couvrant le visage</li> <li>• Solution hydro-alcoolique entre chaque patients</li> <li>• Pas de prêt de stylo</li> <li>• CB : film plastique sur le TPE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masque FFP2 ou chirurgical</li> <li>• Protections pour les yeux</li> <li>• Solution hydro-alcoolique ou lavage des mains entre chaque patients</li> <li>• Masque ou visière couvrant le visage</li> <li>• Désinfection de la salle entre chaque patients (poignées, bac affaires, coins du divan, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitation du nombre de patients par jour (réduction du nombre de praticiens, élargissement des horaires d'ouverture)</li> <li>• Sièges espacés de 1,5m (suppression canapés)</li> <li>• Suppression des revues, jouets et autres objets</li> <li>• Pièce désinfectée 2x/jour</li> <li>• Demande à l'accueil pour accéder aux toilettes</li> <li>• Aération par les fenêtres (pas de climatisation)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Désinfection entre chaque patients</li> <li>• Présence de bacs pour déposer les affaires du patient</li> <li>• Suppression de tous les objets non essentiels</li> <li>• Limitation de la climatisation</li> <li>• Désinfection des clim 2x/jour avec kits professionnels</li> <li>• Aération des pièces</li> </ul>

## Facteurs de risques du COVID 19

- âge > 70 ans
- Maladies CV ou respiratoires (BPCO, mucoviscidose)
- Immunodéprimé • Cancer, hémopathie, cirrhose
- Grossesse (à tout stade) • Obésité, diabète
- Insuffisance rénale
- Prise AINS dans les 5j, AIS au long cours

## Conseils sur le port du masque

- Appui à la racine du nez, couvre le visage
- Ne pas se toucher le visage
- Enlever le masque par les élastiques
- Avant/après le masque, lavage des mains ou SHA
- Changer toutes les 4h (Chirurgical) ou 8h (FFP2)
- Si lavable, 30 min à 60° + sèche-linge

Ce document est une synthèse du Plan de reprise d'activité.

Ces conseils ne se substituent pas aux recommandations des autorités sanitaires qui sont évolutives